

TD DE MODÈLES LINÉAIRES I - SÉRIE 1 : RAPPELS

Exercice 1.

1) Soit U de loi uniforme sur $[0, 1]$. Calculer de deux façons différentes la loi de

$$X = -\log(1 - U).$$

2) Soit F une fonction de répartition continue et strictement croissante, et U de loi uniforme sur $[0, 1]$. Quelle est la loi de la variable aléatoire $F^{-1}(U)$, où F^{-1} est la fonction réciproque de F ?

Exercice 2. Une variable aléatoire est dite de loi Gamma de paramètres α et λ ($\alpha > 0, \lambda > 0$), notée $\Gamma(\alpha, \lambda)$, si sa loi a la densité:

$$f(x; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0, +\infty)}(x),$$

où $\forall \alpha > 0, \Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$.

1) Soit X une variable aléatoire réelle de loi $\Gamma(\alpha, \lambda)$. Calculer sa transformée de Laplace. Calculer sa moyenne et sa variance par deux méthodes.

2) Soit X une variable aléatoire réelle de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Donner la loi de X^2 .

3) Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de lois respectives $\Gamma(\alpha_1, \lambda)$ et $\Gamma(\alpha_2, \lambda)$.

a) Donner la loi de $X + Y$.

b) Montrer que $X + Y$ et $\frac{X}{X+Y}$ sont indépendantes et calculer leur loi de probabilité.

4) Si X_1, \dots, X_n sont n variables aléatoires réelles indépendantes et de même loi exponentielle de paramètre λ , donner la loi de la somme $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

5) Si Y_1, \dots, Y_n sont n variables aléatoires réelles indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$, donner la loi de probabilité de $Z = Y_1^2 + \dots + Y_n^2$ et calculer sa transformée de Laplace, sa moyenne et variance.

Rappels :

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi},$$

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \forall \alpha > 0,$$

$$B(\alpha_1, \alpha_2) = \int_0^1 u^{\alpha_1-1} (1-u)^{\alpha_2-1} du = \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)}, \forall \alpha_1, \alpha_2 > 0,$$

La densité d'une loi $\beta(a, b)$, $a, b > 0$, est $f(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} \mathbf{1}_{0 \leq x \leq 1}$.

Exercice 3. Soient X et ξ deux variables aléatoires indépendantes, ayant des moments d'ordre 2 finis, avec $E(X) = E(\xi) = 0$.

1) On pose $Y = h(X) + \xi$, où h est une fonction borélienne à valeurs réelles. Montrer que $E(Y/X) = h(X)$, et qu'une condition nécessaire et suffisante pour que cette égalité soit vraie est que $E(\xi/X) = 0$.

2) On pose $Y = bX + \xi$, où b est un réel. Montrer que

$$E(Y/X) = \frac{\text{Cov}(Y, X)}{\text{Var}(X)} X.$$

3) On pose $Y = X^2 + \xi$, et on suppose que la loi de X est symétrique. Montrer que $E(Y/X) = X^2$, mais que $\text{Cov}(Y, X) = 0$.